MoviGo® Duo

Saquetas solução oral

DISPOSITIVO MÉDICO

Alívio eficaz e suave da prisão de ventre associada a gases e barriga inchada.

1. O que é o produto e para que é utilizado

MoviGo® Duo é um dispositivo médico concebido para ajudar a aliviar a obstipação ou as fezes difíceis de evacuar, quando associadas a gases e barriga inchada.

MoviGo® Duo contém Macrogol 4000 para tratar a obstipação e Simeticone para ajudar a aliviar o inchaço.

Macrogol 4000 amolece as fezes ao atrair água para o intestino. Isto ajuda a manter as fezes hidratadas e mais fáceis de defecar, tornando os movimentos intestinais mais confortáveis e regulares, sem causar uma necessidade súbita ou urgente de ir à casa de banho. O Macrogol 4000 não é praticamente absorvido pelo organismo. Percorre o sistema digestivo e é eliminado confortavelmente com as fezes.

O simeticone rompe as bolhas de gás aprisionadas para eliminar o gás gastrointestinal associado à obstipação.

1.1 Composição: Cada saqueta contém:
10 g de Macrogol 4000, 100 mg de simeticone

Excipientes: Água, sucralose, aroma de laranja, glicerina vegetal, polissorbato 80, ésteres de sacarose, sorbato de potássio.

2. Dosagem e duração do tratamento

A dose recomendada é:
- Crianças de 1 aos 6 anos: 1 saqueta por dia.
- Adultos e crianças a partir dos 6 anos: 2 saquetas por dia.

Pode beber o produto diretamente da saqueta ou diluí-lo com água, se necessário. É aconselhável tomar o produto entre as refeições.

Não é necessário ajustar a dose em doentes com insuficiência renal.

A duração do tratamento é geralmente de 2 semanas. No entanto, pode ser necessário um tratamento repetido ou prolongado em caso de obstipação refratária ou crónica. A obstipação pode ser causada por medicamentos como analgésicos (opioides) ou medicamentos para o tratamento da doença de Parkinson (anticolinérgicos). Doenças como a esclerose múltipla ou a doença de Parkinson podem causar obstipação refratária.

Em todo o caso, não utilize este produto durante mais de 30 dias consecutivos sem consultar o seu médico.

3. Contraindicações

Não tomar em caso de intolerância ao produto ou de hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes ou ao macrogol.

Não utilizar este produto em crianças com menos de 1 ano de idade.

Não tomar este produto se sofrer de:
- Estenose intestinal
- Perfuração intestinal
- Doença intestinal inflamatória (como doença de Crohn, colite ulcerosa).

Não tomar em caso de obstrução intestinal.

4. Gravidez e amamentação

Não existem dados disponíveis sobre a utilização deste produto durante a gravidez ou a amamentação. Se estiver grávida, a tentar engravidar ou a amamentar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este produto.

5. Efeitos indesejáveis possíveis

Recomenda-se que não se exceda a dose sugerida, uma vez que doses mais elevadas podem causar efeitos indesejáveis inesperados.

Podem ocorrer perturbações gastrointestinais como borborismo, dores abdominais, náuseas e diarreia ligeira (sobretudo no início). Se os efeitos indesejáveis se agravarem ou não desaparecerem em poucos dias, ou se detetar efeitos indesejáveis não mencionados neste folheto, informe o seu médico.

Raramente, podem ocorrer reações de hipersensibilidade (erupção cutânea e urticária). Se sentir estes efeitos indesejáveis, pare de tomar o produto e consulte imediatamente o seu médico.

6. Interações com suplementos alimentares e medicamentos

Este produto pode modificar a biodisponibilidade de outros medicamentos se forem tomados ao mesmo tempo. Em particular, o poder osmótico do macrogol e a alteração no trânsito gastrointestinal podem afetar negativamente a sua eficácia.

Assim, é conveniente que a ingestão do produto seja adiada pelo menos 2 horas após a administração de medicamentos tomados por via oral ou de quaisquer outros medicamentos ou suplementos alimentares. Consulte o seu médico antes de tomar este produto se estiver a tomar outros medicamentos.

7. Conservação

Mantenha este produto num local seco, entre 15 °C e 25 °C, e afastado de fontes diretas de calor ou luz. Abrir a saqueta apenas no momento da utilização. Não utilizar se as saquetas estiverem danificadas. Manter fora do alcance das crianças.

8. Advertências e precauções

Para manter uma boa saúde, incluindo um intestino saudável, recomenda-se que siga uma dieta adequada e beba quantidades suficientes de líquidos (geralmente 2,0 a 2,5 litros por dia).

Antes de utilizar este produto em crianças, é aconselhável consultar um médico.

O simeticone pode interferir com o efeito de alguns reagentes utilizados no diagnóstico, como a goma guaiaco.

9. Prazo de validade

Não tomar após o prazo de validade impresso na embalagem. O prazo de validade refere-se ao produto na sua embalagem intacta quando armazenado.

10. Eliminação

Qualquer produto não utilizado deve ser eliminado de acordo com as exigências locais. Não deite lixo para o chão e elimine os resíduos da embalagem deste produto de forma responsável.

MoviGo Duo, Norgine e o seu logótipo são marcas do grupo de empresas Norgine.




SllT srl

Via Ariosto 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio (MI) ITÁLIA



{Norgine Portugal Farmacêutica
Unipessoal, LDA.
Edifício Office Oriente,
Rua do Mar da China nº 3, Piso 4A,
1990-138 Lisboa, Portugal}









A sua opinião é importante! Para avaliar a sua satisfação com o produto, dedique 5 minutos a preencher o breve questionário que se encontra no seguinte endereço https://siit-pms.com/GC04B2

ou digitalizando este código QR:

Última revisão: 02/2026