MoviGo®

Saqueta

DISPOSITIVO MÉDICO CE0426

Para fezes difíceis de evacuar, movimentos intestinais difíceis e pouco frequentes, e prisão de ventre

1. O que é o produto e para que é utilizado

Este produto é um dispositivo médico que ajuda a restaurar o movimento intestinal natural e regular em adultos, adolescentes, crianças com mais de 2 anos de idade e idosos.
Utiliza o poder da água, com a sua fórmula em 3 etapas, para atrair água para as fezes difíceis de evacuar, a fim de hidratar, amolecer e restaurar o movimento intestinal natural e regular.
Pode ser utilizado para aliviar as fezes difíceis de evacuar e a prisão de ventre. Uma vez que este produto amolece as fezes ajuda a tornar o movimento intestinal confortável, não provocando cólicas ou dores abdominais.
Este produto não é praticamente absorvido pelo organismo e é evacuado com as fezes durante o movimento intestinal. A sua eficácia não diminui com o tempo.

1.1 Ingredientes

Cada saqueta deste produto contém 10 g de Macrogol 3350 em pó.

2. Embalagem

Este produto é um pó numa saqueta que é dissolvido e transformado numa solução oral.
Este produto apresenta-se em embalagens de 10, 12, 20 e 24 saquetas. É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

3. Como tomar

Crianças dos 2 aos 11 anos (de 12 kg a 20 kg):
1-2 saquetas (10 g cada) por dia, em função da gravidade da prisão de ventre ou das fezes difíceis de evacuar.
Adultos e crianças com mais de 11 anos (ou com mais de 20 kg):
1 saqueta (10 g) 1-3 vezes por dia, em função da gravidade da prisão de ventre ou das fezes difíceis de evacuar.
Se se esquecer de tomar uma dose, não tome uma dose a dobrar. Aguarde e tome a dose seguinte à hora habitual.

A duração do tratamento é geralmente de 2 semanas. Se necessário, o tratamento pode ser repetido.

4. Contraindicações

Não tome este produto se sofrer de:

- Estenose intestinal
- Perfuração intestinal
- Doença intestinal inflamatória (por ex., doença de Crohn, colite ulcerosa)
- Não tome em caso de bloqueio intestinal (obstrução intestinal, íleo paralítico)

Nos doentes com insuficiência renal não é necessário ajustar a dose. A prisão de ventre pode ser causada por alguns medicamentos, incluindo analgésicos (opiáceos) e tratamentos para a doença de Parkinson (anticolinérgicos). Também pode ocorrer como resultado de outras doenças, incluindo a esclerose múltipla ou a doença de Parkinson.

5. Gravidez e amamentação

Não existem dados disponíveis sobre a utilização deste produto durante a gravidez ou a amamentação. Se estiver grávida, a tentar engravidar ou a amamentar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este produto.

6. Efeitos indesejáveis

Recomenda-se que não exceda a dose sugerida, uma vez que doses mais elevadas podem causar efeitos indesejáveis inesperados. Este produto pode causar queixas ligeiras, tais como perturbações gastrointestinais, borborismo (ruídos intestinais), dores abdominais, náuseas e diarreia ligeira (especialmente no início do tratamento). Raramente, podem ocorrer reações de hipersensibilidade (erupção cutânea, urticária). Consulte o seu médico ou farmacêutico se tiver quaisquer reações adversas, mesmo que os seus sintomas não estejam descritos neste folheto. Se os sintomas persistirem, consulte o seu médico.

7. Sobredosagem

Em caso de sobredosagem, podem ocorrer os seguintes efeitos: dores intensas, distensão

abdominal, diarreia e vómitos que podem provocar um desequilíbrio eletrolítico. Se ocorrerem reações adversas, contacte imediatamente o seu médico.

8. Interações com medicamentos
Até à data, não existem interações conhecidas com medicamentos. No entanto, se precisar de tomar um medicamento em simultâneo com este produto, a próxima dose deste produto deverá ser administrada, pelo menos, 2 horas após a toma de outros medicamentos por via oral, (incluindo homeopáticos) ou suplementos alimentares. A eficácia deste produto pode ser afetada negativamente devido ao poder osmótico do macrogol e ao aumento da velocidade do trânsito gastrointestinal. Consulte o seu médico antes de tomar MoviGo se estiver a utilizar outras terapêuticas.

9. Conservação
Manter este produto num local seco e afastado de fontes diretas de calor ou luz: abrir a saqueta apenas no momento da utilização. Não utilizar se as saquetas estiverem danificadas. Manter fora do alcance das crianças. Manter o dispositivo a uma temperatura inferior a 25 °C.

10. Advertências e precauções
Não utilizar o produto em crianças com menos de 2 anos de idade. Se estiver grávida ou a amamentar, deve tomar MoviGo apenas após recomendação do seu médico. Recomenda-se que não sejam excedidas as quantidades sugeridas, uma vez que doses mais elevadas podem causar efeitos indesejáveis inesperados.
Pode ser necessária a utilização prolongada em caso de obstipação refratária e/ou crónica.
Não utilizar durante mais de 30 dias consecutivos; se os sintomas persistirem, consulte o seu médico.
Não tomar em caso de intolerância ao produto. Não tomar em caso de hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos ingredientes ou ao macrogol. Cada saqueta é descartável e deve ser aberta apenas no momento da utilização.

11. Prazo de validade
Não tomar após o prazo de validade impresso na embalagem.
O prazo de validade refere-se ao produto na sua embalagem intacta quando armazenado.

12. Precauções de Eliminação
Qualquer produto não utilizado deve ser eliminado de acordo com as exigências locais.
Evite a eliminação indevida. Elimine os resíduos da embalagem deste produto de forma responsável.

MoviGo, Norgine e o seu logótipo são marcas registadas do grupo de empresas Norgine.

SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITÁLIA

{ Norgine Portugal Farmacêutica Unipessoal, LDA.
Edifício Office Oriente,
Rua do Mar da China nº 3,
Piso 4A, 1990-138 Lisboa, Portugal}









A sua opinião é importante! Para avaliar a sua satisfação com o produto, dedique 5 minutos a preencher o breve questionário que se encontra no seguinte endereço https://siit-pms.com/GC04B2

ou digitalizando este código QR:



Última revisão: 02/2026